

Erklärung der verwendeten Symbole




Aussaat unter Dach (z. B. Gewächshaus/Fensterbank)



Aussaat im Freiland



Pflanzenabstand (nach eventuellem Pikieren)



Aussaattiefe (bei Lichtkeimer 0 cm, Samen nur andrücken)



Optimale Keimtemperatur
(Mindestkeimtemperatur)



Ernte



Bodenbeschaffenheit. Licht



Nährstoffverbrauch (Stark-/Mittel-/Schwachzehrer)

Aubergine

Solanum melongena (Nachtschattengewächs)




Januar - April



Juni



60 cm x 60 cm



0,5 cm



27°C (mind. 18°C)



August - Oktober



Humusreich, locker. Sonne



Mittelzehrer

Nachbarn



Blumenkohl

Brokkoli

Kohl

Kopfsalat

Pflücksalat

Spinat



Erbsen

Kartoffeln

Paprika

Rote Beete

Basilikum

Ocimum basilicum (Lippenblütler)



Februar - Juli



Mai - Juli



20 cm x 30 cm



0 cm (Lichtkeimer)



25°C (mind. 12°C)



Mai - Oktober



Nährstoffreich. Sonne



Schwachzehrer

Nachbarn



Gurken

Kohlrabi

Schwarzwurzel

Tomaten

Zwiebelarten

Blumenkohl

Brassica oleracea var. botrytis (Kreuzblütler)




Februar



April - Juli



50-75 cm x 50-75 cm



1 cm



20°C (mind. 8°C)



Juli - November



Lehmig, kalkhaltig. Sonne/Halbs.



Starkzehrer

Nachbarn



Auberginen

Erbsen

Kartoffeln

Sellerie



Kohl

Zwiebeln

Bohne

Faba (Schmetterlingsblütler)




Januar – Mai (sortenabhängig)



Februar – Juli (sortenabhängig)



10-30 cm x 20-50 cm



3-5 cm



23°C (mind. 8°C)



Juni – Oktober (sortenabhängig)



Humusreich. Sonne/Halbs.



Mittel/Schwachzehrer

Nachbarn



Bohnenkraut

Chicorée

Dill

Erdbeeren

Gurken

Kartoffeln

Kohl

Kohlrabi

Kopfsalat

Mais

Pastinaken

Pflücksalat

Radieschen

Rote Beete

Schwarzwurzel

Sellerie

Spinat

Zucchini

Erbsen

Fenchel

Knoblauch

Lauch

Zwiebeln

Borretsch


Borago officinalis (Raublattgewächs)



April - Juni



40 cm x 40 cm



2 cm



24°C (mind. 8°C)



Das ganze Jahr möglich



Nährhaft, feucht, durchlässig. Sonne



Schwachzehrer

Nachbarn



Erdbeeren

Gurken

Kohl

Zucchini

Abwehr gegen Kohlschädlinge

Brokkoli

Brassica oleracea var. italica (Kreuzblütler)




Februar - April



Juni



40-50 cm x 40-50 cm



1 cm



20°C (mind. 2°C)



August – April (sortenabhängig)



Nährstoffreich, kalkhaltig. Sonne



Starkzehrer

Nachbarn



Auberginen

Erbsen

Kartoffeln

Sellerie



Kohl

Zwiebeln

Chicorée

Cichorium intybus var. *foliosum* (Korbblütler)




April



Mai - Juni



8-10 cm x 25-30 cm



1,5 cm



22°C (mind. 13°C)



September - Januar



Tiefgründig, stickstoffarm. Sonne



Mittelzehrer

Nachbarn



Bohnen

Fenchel

Kopfsalat

Möhren

Pastinaken

Dill


Anethum graveolens (Doldenblütler)



April - Juli



23 cm x 30 cm



1 cm



24°C (mind. 8°C)



Juni - September



Sandig bis lehmig. Sonne/Halbs.



Schwachzehrer

Nachbarn



Bohnen

Erbsen

Gurken

Kohl

Kopfsalat

Möhren

Pflücksalat

Rote Beete

Zwiebeln

Verbessert den Geschmack von Kartoffeln

Erbse

Pisum sativum subsp. sativum (Hülsenfrüchtler)




Februar - März



April - Juli



8-10 cm x 45-60 cm



5 cm



18°C (mind. 6°C)



Juni - September



Humusreich, feinkrümelig. Sonne



Schwachzehrer

Nachbarn



Blumenkohl
Brokkoli
Dill
Fenchel
Gurken
Kohl
Kohlrabi
Kopfsalat
Mais
Möhren
Pastinaken
Radieschen
Rettich
Spinat
Zucchini



Auberginen
Bohnen
Kartoffeln
Knoblauch
Lauch
Paprika
Zwiebeln

Erdbeere


Fragaria (Rosengewächs)



Wird gepflanzt: November - März



45 cm x 90 cm



Juni - August



Humusreich, locker. Sonne



Mittelzehrer

Nachbarn



Bohnen

Knoblauch

Kopfsalat

Lauch

Radieschen

Rettich

Spinat

Zwiebeln



Kohl

Feldsalat


Valerianella locusta (Baldriangewächs)



März - September



5 cm x 8-15 cm



2 cm



18°C (mind. 5°C)



April - Dezember



Kalkhaltig. Sonne



Schwachzehrer

Nachbarn



Endivien

Erdbeeren

Kohlrabi

Radieschen

Winterportulak

Zwiebeln



Baldrian

Fenchel


Foeniculum vulgare var. azoricum (Doldenbl.)



ab Januar



30 cm x 30 cm



0,5 cm



27°C (mind. 6°C)



ab Mai



Humusreich, kalkhaltig. Sonne



Mittelzehrer

Nachbarn



Chicorée

Erbsen

Gurken

Kopfsalat

Pflücksalat



Bohnen

Kohlrabi

Paprika

Tomaten

Gartenkresse


Lepidium sativum (Kreuzblütler)



März - September



dicht x 10 cm



0 cm (Lichtkeimer)



6°C (mind. 1°C)



April - Oktober



Humusreich, locker. Sonne/Halbs.



Schwachzehrer

Nachbarn



Radieschen

Rettich

Salat

Gegen Blatt- und Blutläuse
bei Obstbäumen und Tomaten

Gurke

Cucumis sativus (Kürbisgewächs)



Februar - April



Mai - Juni



45-75 cm x 45-75 cm



2 cm



25°C (mind. 15°C)



Juli - September



Humusreich, locker. Sonne



Starkzehrer

Nachbarn



Bohnen

Dill

Erbsen

Fenchel

Knoblauch

Kohl

Kopfsalat

Lauch

Mais

Paprika

Sellerie

Spinat

Zwiebeln



Tomaten

Radieschen

Zucchini

Kapuzinerkresse

Tropaeolum majus (Kapuzinerkressengew.)




März



April - Juni



20-30 cm x 20-30 cm



2 cm



25°C (mind. 15°C)



Juli - September



Sandig bis lehmig. Sonne/Halbs.



Schwachzehrer

Nachbarn



Kartoffeln

Radieschen

Rettich

Tomaten

Zucchini

Obstbäume

Gegen Blatt- und Blutläuse

Kartoffel


Solanum tuberosum (Nachtschattengewächs)



Wird gepflanzt: März - Mai



30-38 cm x 45-75 cm



Juni - Oktober



Leicht, tiefgründig. Sonne/Halbs.



Starkzehrer

Nachbarn



Bohnen

Blumenkohl

Brokkoli

Kapuzinerkresse

Kohlrabi

Mais

Pfefferminze

Spinat



Auberginen

Erbsen

Kohl

Paprika

Pflücksalat

Rote Beete

Sellerie

Tomaten

Zwiebeln

Kerbel

Anthriscus cerefolium (Doldenblütler)




März - Mai



Mai - August



10 cm x 30 cm



0 cm (Lichtkeimer)



24°C (mind. 6°C)



Juni - Oktober



Nährhaft, feucht. Halbs./Schatten



Schwachzehrer

Nachbarn



Radieschen

Salat

Soll Schnecken abwehren

Knoblauch


Allium sativum (Amaryllisgewächs)



Oktober - April



15 cm x 15 cm



1,5 cm



23°C (mind. 5°C)



Juni - September



Humusreich, locker. Sonne



Mittelzehrer

Nachbarn



Erdbeeren

Gurken

Möhren

Salat

Spargel

Rote Beete

Tomaten

Zwiebeln



Bohnen

Erbsen

Kohl

Kohl

Brassica (Kreuzblütler)




Januar – Juli (sortenabhängig)



April – August (sortenabhängig)



40-50 cm x 40-50 cm



1 cm



20°C (mind. 8°C)



April – Dezember (sortenabhängig)



Humusreich. Sonne/Halbs.



Starkzehrer

Nachbarn



Auberginen

Bohnen

Dill

Erbsen

Gurken

Kopfsalat

Lauch

Mangold

Paprika

Pfefferminze

Radieschen

Rote Beete

Sellerie

Spinat

Tomaten



Blumenkohl

Brokkoli

Erdbeeren

Kartoffeln

Knoblauch

Kohlrabi

Zwiebeln

Kohlrabi

Brassica oleracea var. gongylodes (Kreuzbl.)




Februar - Juli



März - Juli



15 cm x 30 cm



1 cm



20°C (mind. 12°C)



Mai - Oktober



Humusreich. Sonne/Halbs.



Mittelzehrer

Nachbarn



Bohnen

Erbsen

Kartoffeln

Kopfsalat

Rote Beete

Sellerie

Spinat

Tomaten



Fenchel

Kohl

Kopfsalat

Lactuca sativa var. capitata (Korbblütler)




Februar - April



April - September



25 cm x 25 cm



1,5 cm



17°C (mind. 4°C)



Mai - November



Humusreich, tiefgründig. Sonne



Schwachzehrer

Nachbarn



Auberginen

Bohnen

Bohnenkraut

Chicorée

Dill

Erbsen

Erdbeeren

Fenchel

Gurken

Kohl

Kohlrabi

Lauch

Mais

Möhren

Pfefferminze

Radieschen

Rote Beete

Schwarzwurzel

Spinat

Tomaten

Zwiebeln

Sellerie

Koriander


Coriandrum sativum (Doldenblütler)



März - Juni



15 cm x 30 cm



1-2 cm



25°C (mind. 5°C)



Juni - September



Leicht kalkhaltig. Sonne



Schwachzehrer

Nachbarn



Erdbeeren

Frühkartoffeln

Gurken

Kohlarten

Rote Rüben

Verbessert den Geschmack von Kartoffeln

Kümmel


Carum carvi (Doldenblütler)



April



15-20 cm x 30 cm



0 cm (Lichtkeimer)



22°C (mind. 6°C)



ab Juli



Mager. Sonne



Nachbarn



Verbessert den Geschmack von Kartoffeln

Kürbis

Cucurbita (Kürbisgewächs)




April



Mai - Juni



60-120 cm x 60-120 cm



3 cm



23°C (mind. 10°C)



Juli - Oktober



Humusreich, nährstoffreich. Sonne



Starkzehrer

Nachbarn



Mais

Bohnen

Brokkoli

Ringelblumen



Dill

Gurken

Kohl

Lauch/Porree

Allium porrum (Amaryllisgewächs)




ab Januar



März - April



15 cm x 30 cm



1,5 cm



23°C (mind. 8°C)



September – Mai (sortenabhängig)



Humusreich, feucht. Sonne/Halbs.



Starkzehrer

Nachbarn



Erdbeeren

Gurken

Kohl

Kopfsalat

Möhren

Pastinaken

Schwarzwurzel

Sellerie

Tomaten



Bohnen

Erbsen

Rote Beete

Zwiebeln

Lavendel

Lavandula angustifolia/officinalis (Lippenbl.)



Februar - Mai



Mai - Juli



30 cm x 30 cm



0,5 cm



24°C (mind. 16°C)



Juli - September



Nährstoffarm, durchlässig. Sonne



Nachbarn



Soll bei Gemüse Blattläuse abwehren

Mais

Zea mays (Süßgras)




April



Mai



30-60 cm x 30-60 cm



3-4 cm



20°C (mind. 10°C)



August - September



Humusreich, nährstoffreich. Sonne



Starkzehrer

Nachbarn



Bohnen

Erbsen

Gurken

Kartoffeln

Kopfsalat

Spinat

Zucchini



Rote Beete

Sellerie

Majoran


Origanum majorana (Lippenblütler)



März - April



20 cm x 60 cm



0 cm (Lichtkeimer)



23°C (mind. 12°C)



Juni - September



Leicht, nährstoffreich. Sonne



Schwachzehrer

Nachbarn



Möhren

Mangold

Beta vulgaris (Gänsefußgewächs)




März - August



März - Oktober



30-60 cm x 30-60 cm



2 cm



20°C (mind. 6°C)



Mai - Dezember



Humusreich. Sonne/Halbs.



Mittelzehrer

Nachbarn



Kohl

Möhren

Pastinaken

Radieschen



Rote Beete

Schwarzwurzel

Spinat

Möhre

Daucus carota (Doldenblütler)



ab Februar



März - Juli



1-5 cm x 15-20 cm



3 cm



24°C (mind. 4°C)



Mai - Dezember



Humusreich, locker. Sonne



Mittelzehrer

Nachbarn



Chicorée

Dill

Erbsen

Knoblauch

Kopfsalat

Lauch

Mangold

Paprika

Pfefferminze

Radieschen

Schwarzwurzel

Tomaten

Zwiebeln

Paprika


Capsicum (Nachtschattengewächs)



Februar - April



30-50 cm x 30-50 cm



0,5 cm



25°C (mind. 16°C)



Juli - Oktober



Humusreich, feucht. Sonne



Mittelzehrer

Nachbarn



Gurken
Kohl
Möhren
Tomaten



Auberginen
Erbsen
Fenchel
Kartoffeln
Rote Beete

Pastinake


Pastinaca sativa (Doldenblütler)



Februar - März



10-15 cm x 20-30 cm



3 cm



23°C (mind. 6°C)



Juli - Februar



Tiefgründig. Sonne



Mittelzehrer

Nachbarn



Chicorée

Bohnen

Erbsen

Lauch

Mangold

Pflücksalat

Zwiebeln

Petersilie


Petroselinum crispum (Doldenblütler)



Mai - August



25-30 cm x 25-30 cm



1 cm



22°C (mind. 3°C)



Juni - Oktober



Humusreich, durchlässig. Sonne



Mittelzehrer

Nachbarn



Kartoffeln

Kohl

Rettich



alle Salate

Pfefferminze

Mentha piperita (Lippenblütler)




ab Februar



nicht vor Mitte Mai



15-50 cm x 30-50 cm



0 cm (Lichtkeimer)



23°C (mind. 16°C)



Juni – August (das ganze Jahr möglich)



Nährstoffreich, feucht. Sonne/Halbs.



Mittelzehrer

Nachbarn



Kartoffeln

Kohl

Kopfsalat

Möhren

Tomaten

Gegen Kohlweißlinge

Pflücksalat

Lactuca sativavar. crispata (Korbblütler)




ab März



April - August



2 cm x 30 cm



1 cm



15°C (mind. 3°C)



April - Oktober



Humusreich, locker. Sonne/Halbs.



Mittelzehrer

Nachbarn



Auberginen

Bohnen

Bohnenkraut

Brokkoli

Dill

Erbsen

Fenchel

Kohlarten

Mais

Mangold

Möhren

Pastinaken

Radieschen

Rote Beete

Schwarzwurzel

Spinat

Zwiebeln

Kartoffeln

Zucchini

Radieschen

Raphanus sativus subsp. sativus (Kreuzbl.)




Januar - Februar



März - August



2,5 cm x 15 cm



1 cm



21°C (mind. 3°C)



Mai - November



Humusreich, leicht. Sonne



Mittelzehrer

Nachbarn



Bohnen

Gurken

Erbsen

Erdbeeren

Kohl

Kopfsalat

Mangold

Möhren

Pflücksalat

Schwarzwurzel

Spinat

Rettich

Raphanus sativus (Kreuzbl.)




März - August



April - August



10-15 cm x 25-30 cm



1 cm



23°C (mind. 8°C)



Mai - Dezember



Humusreich, lehmig, locker. Sonne



Mittelzehrer

Nachbarn



Bohnen

Gurken

Erbsen

Erdbeeren

Kohl

Kopfsalat

Mangold

Möhren

Pflücksalat

Schwarzwurzel

Spinat

Ringelblume

Calendula officinalis (Korbblütler)



März - Mai



April - Juni



25-30 cm x 25-30 cm



1 cm



10 - 20°C (nicht bei Frost)



Juni - September



Lehmig. Sonne



Schwachzehrer

Nachbarn



Obst

Gemüse

Gegen Schädlinge

Rosmarin

Rosmarinus officinalis (Lippenblütler)




Februar - Mai



April - Juni



15 cm x 90 cm



1 cm



24°C (mind. 3°C)



Juni - März



Durchlässig, kalkhaltig. Sonne



Schwachzehrer

Nachbarn



Möhren

Rote Beete


Beta vulgaris (Gänsefußgewächs)



März - Juli



10 cm x 23-30 cm



2 cm



20°C (mind. 8°C)



Juni - Oktober



Humusreich, locker. Sonne/Halbs.



Mittelzehrer

Nachbarn



Bohnen

Bohnenkraut

Dill

Knoblauch

Kohl

Kohlrabi

Kopfsalat

Pflücksalat

Zucchini

Zwiebeln



Auberginen

Kartoffeln

Lauch

Mais

Mangold

Paprika

Spinat

Salbei

Salvia officinalis (Lippenblütler)




Februar - April



März - Juni



15 cm x 60 cm



0,2 cm



24°C (mind. 12°C)



Juni – Oktober (das ganze Jahr möglich)



Durchlässig. Sonne/Halbs.



Schwachzehrer

Nachbarn



Allgemein günstig

Soll Blattläuse und Schadraupen abwehren

Gegen Kohlweißlinge

Schnittlauch

Allium schoenoprasum (Amaryllisgewächs)



ab Februar



März - April



30 cm x 30 cm



2 cm



24°C (mind. 5°C)



Juni - Oktober



Feucht, kalkhaltig. Sonne/Halbs.



Mittelzehrer

Nachbarn



Kohlarten

Möhren

Schwarzwurzel


Scorzonera hispanica (Korbblütler)



April - Mai



15 cm x 30 cm



2 cm



22°C (mind. 3°C)



September - Februar



Sandig-humos, locker. Sonne/Halbs.



Mittelzehrer

Nachbarn



Bohnen

Kopfsalat

Lauch

Möhren

Pflücksalat

Radieschen

Rettich



Mangold

Sellerie, knollen-


Apium graveolens var. rapaceum (Doldenbl.)



ab Februar



50-70 cm x 50-70 cm



0 cm (Lichtkeimer)



28°C (mind. 18°C)



Oktober – Erster Frost



Sandig-humos, locker. Sonne/Halbs.



Starkzehrer

Nachbarn



Bohnen

Blumenkohl

Gurken

Kohl

Kohlrabi

Lauch

Spinat



Kartoffeln

Kopfsalat

Mais

Sellerie, stangen-


Apium graveolens var. dulce (Doldenbl.)



ab Februar



50 cm x 50 cm



0 cm (Lichtkeimer)



28°C (mind. 18°C)



Oktober – Erster Frost



Sandig-humos, locker. Sonne/Halbs.



Starkzehrer

Nachbarn



Gurken

Kohlarten

Lauch

Tomaten

Sommerbohnenkraut

Satureja hortensis (Lippenblütler)




Februar - März



März - Juni



25 cm x 35-45 cm



0 cm (Lichtkeimer)



25°C (mind. 10°C)



Juni - September



Leicht, kalkhaltig. Sonne



Schwachzehrer

Nachbarn



Bohnen

Kopfsalat

Pflücksalat

Rote Beete

Zwiebelarten

Abwehr gegen Bohnenläuse

Spinat

Spinacia oleracea (Gänsefußgewächs)




Januar - Februar



Januar - September



8-15 cm x 30 cm



3 cm



19°C (mind. 2°C)



Januar - Dezember



Humos, durchlässig. Sonne/Halbs.



Mittelzehrer

Nachbarn



Auberginen

Bohnen

Erbsen

Erdbeeren

Gurken

Kartoffeln

Kohl

Kohlrabi

Kopfsalat

Mais

Pflücksalat

Radieschen

Sellerie

Mangold

Rote Beete

Tagetes

Tagetes (Korbblütler)




März - Mai



Mai - Juni



20-25 cm x 20-25 cm



0 cm (Lichtkeimer)



18-20°C



Juli - Oktober



Nährstoffreich, lehmig. Sonne



Starkzehrer

Nachbarn



Obst

Gemüse

Gegen Schädlinge

Thymian

Thymus vulgaris (Lippenblütler)




März - Mai



Mai - Juli



15 cm x 60 cm



0 cm (Lichtkeimer)



21°C (mind. 6°C)



Juni – September (das ganze Jahr möglich)



Durchlässig. Sonne



Schwachzehrer

Nachbarn



Allgemein günstig

Wirkt Blattläusen und Raupen entgegen

Gegen Kohlweißlinge

Tomate


Solanum lycopersicum (Nachtschattengew.)



Januar - April



25-45 cm x 25-45 cm



0,5 cm



26°C (mind. 18°C)



Juli - Oktober



Humusreich, locker. Sonne



Starkzehrer

Nachbarn



Knoblauch

Kohl

Kohlrabi

Kopfsalat

Möhren

Paprika

Pfefferminze

Zwiebeln



Fenchel

Gurken

Kartoffeln

Ysop

Hyssopus officinalis (Lippenblütler)




März - April



Mai



20-30 cm x 20-30 cm



0 cm (Lichtkeimer)



24°C (mind. 12°C)



Juni - August



Kalkhaltig, locker. Sonne



Schwachzehrer

Nachbarn



Allgemein günstig

Soll Schadraupen abwehren

Zucchini

Cucurbita pepo var. *giromontiina* (Kürbisgew.)




April - Juni



Mai - Juli



60-120 cm x 60-120 cm



3 cm



25°C (mind. 10°C)



August - November



Humusreich, locker. Sonne/Halbs.



Starkzehrer

Nachbarn



Bohnen

Erbsen

Mais

Kopfsalat

Rote Beete

Lauch

Möhren

Zwiebeln

Sellerie

Spinat



Gurken

Pflücksalat

Zwiebel

Allium cepa (Amaryllisgewächs)




Januar - März



März - Juni



5-8 cm x 30 cm



2 cm



24°C (mind. 3°C)



Juli - September



Humusreich, locker, lehmig. Sonne



Mittelzehrer

Nachbarn



Dill
Erdbeeren
Gurken
Knoblauch
Kopfsalat
Möhren
Pastinaken
Pflücksalat
Rote Beete
Tomaten
Zucchini



Bohnen
Blumenkohl
Brokkoli
Erbsen
Kartoffeln
Kohl
Lauch